

INSTRUCCIONES

Aerosol nasal de clorhidrato de naloxona

4 mg

Tratamiento de emergencia para la sobredosis con opioides

Importante:

- Para uso exclusivo en la nariz.
- No pruebe el dispositivo de aerosol nasal antes de usarlo.
- Un dispositivo de aerosol nasal contiene una dosis del medicamento.
- Cada dispositivo se dispara solamente una vez.

1 REVISE

DESPIERTE



Paso 1: REVISE si sospecha de sobredosis:


- **REVISE** si se sospecha de sobredosis: la persona no se despierta, tiene mucho sueño o no respira bien.
- Grite "¡Despierta!".
- Sacuda suavemente a la persona.
- Si la persona no está despierta, vaya al Paso 2.

2 ADMINISTRE



Paso 2: ADMINISTRE la primera dosis en la nariz.

- **SOSTENGA** el dispositivo de aerosol nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo.
- **INSERTE** la punta de la boquilla en cualquiera de las FOSAS NASALES.
- **PRESIONE** el émbolo con firmeza para administrar la primera dosis.
- Un dispositivo de aerosol nasal contiene una dosis.



3 PIDA AYUDA



Paso 3: LLAME PARA PEDIR AYUDA

- **LLAME al 911** inmediatamente después de administrar la primera dosis.

4 OBSERVE

2-3 minutos



Paso 4: OBSERVE Y ADMINISTRE EL MEDICAMENTO

- **ESPERE** 2 o 3 minutos después de la primera dosis para darle al medicamento tiempo de actuar.
- Si la persona se despierta: Vaya al paso 5.
- Si la persona no se despierta:
 - **CONTINÚE ADMINISTRANDO** dosis cada 2 o 3 minutos hasta que la persona se despierte.
 - Es seguro seguir administrando dosis.

5 PERMANEZCA A SU LADO



Paso 5: PERMANEZCA A SU LADO

- **PERMANEZCA A SU LADO** hasta que llegue la ambulancia: incluso si la persona se despierta.
- **ADMINISTRE** otra dosis si la persona vuelve a tener sueño.
- Es posible que deba administrar todas las dosis en el envase.



Manufactured by Padagis®
Yerulam, Israel

Para emergencias por opioides, llame al 911. Si tiene preguntas sobre el aerosol nasal de naloxona HCl 4 mg, llame a Padagis® al 1-866-634-9120 o visite www.padagis.com.